

İÇ FINDIK GÜVESİ (*Paralipsa gularis*)



İç findık Güvesi ergini

Tanımı ve Yaşayışı:

- Ön kanatlar, gri, esmer ile gri maviden kahve-rengimsi toprak rengine kadar değişen renklerde.
- Yumurta 0.7 mm boyda, oval şekilli ve beyaz renklidir.
- Larva olgunlaştığında 20-25 mm boyda, sarımsı, bazen pembe renkli ve kıllıdır.
- Kışı olgun larva halinde depolarda geçirir.
- Mayıs-temmuz aylarında ergin hale gelir.
- Dişi yaşamı süresince ortalama 238 adet yumurta bırakır.
- Yılda 1 döl verir.

Zarar Şekli

- Larvalar buldukları gıda ortamında beslenerek ürün kayıplarına neden olurlar.
- Buna ek olarak çıkardıkları pislikler ve değiştirdikleri gömlek ve baş kapsülü kalıntıları ile ürünün niteliğini bozarlar.

Zararlı Olduğu Ürünler.

- İncir kurdu, Kuru meyve güvesi, Kuru üzüm güvesi ve İç findık güvesi: Kestane, ceviz, iç findık, antepfıstığı, yer fıstığı, badem, susam, ayçiçeği vb. yağlı tohumlarda; hububat ve mamulleri, kakao, süt tozu, baharat, keçiyoynuzu vb. Materyaller.
- Testereli böcek: hububat ve mamulleri ile kurutulmuş meyve ve kurutulmuş sebzeler.

Mücadelesi

Kültürel Önlemler

- Ambarda zararlılara barınak olabilecek yarık, çatlak vb. girintiler sıva ile kapatılır.
- Ambarlama süresince zararlı girişini önlemek üzere kapı ve pencerelere uygun sıklıkta tel geçirilir.
- Ürün çuvallı ise ızgara üstüne istiflenir.
- İstif ve yığınlar ile duvar arasında 0.5 m aralık bırakılır.
- Eski ürün ile yeni ürün veya bulaşık ürün ile temiz ürün ayrı ayrı depolanır.
- Geceleri depolarda ışık yakmaktan kaçınılır.

Kimyasal Mücadele

- Kullanılacak ilaçlar ve dozları hakkında en yakın il veya ilçe müdürlüklerine başvurulmalıdır.