

## İNCİR KURDU (*Ephestia cautella*)



İncir kurdu zararı

İncir kurdu ergin ve larvası

- üErginlerin, boyları 1 cm'dir.
- Ön kanatlar gri renklidir ve üzerlerinde koyu renkli, zikzak biçimli iki bant bulunur.
- Arka kanatlar beyazımsı gri renkli ve saçaklıdır.
- Olgun larva 1 cm boyundadır.
- Vücut koyu renkli halkalardan çıkan kıllarla kaplıdır.
- Erginler 1-2 hafta yaşarlar.
- Uygun koşullarda gelişme süresi 42-52 gündür. Bu zararlı Karadeniz Bölgesi fındık depolarında 3 döl verir.
- Ege bölgesinde ise sergilerde yumurta bıraktıkları incirlerin depolara alınması nedeniyle döl sayısı 4'e kadar çıkabilir.

### Zarar Şekli

- Larvalar buldukları gıda ortamında beslenerek ürün kayıplarına neden olurlar.
- Buna ek olarak çıkardıkları pislikler ve değiştirdikleri gömlek ve baş kapsülü kalıntıları ile ürünün niteliğini bozarlar.

### Zararlı Olduğu Ürünler.

- İncir kurdu, Kuru meyve güvesi, Kuru üzüm güvesi ve İç fındık güvesi: Kestane, ceviz, iç fındık, antepfıstığı, yer fıstığı, badem, susam, ayçiçeği vb. yağlı tohumlarda; hububat ve mamulleri, kakao, süt tozu, baharat, keçiboynuzu vb. Materyaller.
- Testereli böcek: hububat ve mamulleri ile kurutulmuş meyve ve kurutulmuş sebzeler.

### Mücadelesi

#### Kültürel Önlemler

- Ambarlarda zararlılara barınak olabilecek yarıklar, çatlak vb. girintiler sıva ile kapatılır.
- Ambarlama süresince zararlı girişini önlemek üzere kapı ve pencerelere uygun sıklıkta tel geçirilir.
- Ürün çuvalı ise ızgara üstüne istiflenir.
- İstif ve yığınlar ile duvar arasında 0.5 m aralık bırakılır.
- Eski ürün ile yeni ürün veya bulaşık ürün ile temiz ürün ayrı ayrı depolanır.
- Geceleri depolarda ışık yakmaktan kaçınılır.

#### Kimyasal Mücadele

- Kullanılacak ilaçlar ve dozları hakkında en yakın il veya ilçe müdürlüklerine başvurulmalıdır.