


UN AKARI (*Acarus siro*)

~ 0.5mm



Tanımı ve Yaşayışı:

- Saydam beyaz renkli, yumuşak vücutlu, küçük canlılardır.
- Gözle görülmeleri zor ve 0.4 mm boydadır.
- Bacaklarında ve vücut sonunda uzun kıllar vardır.
- Larva erginden daha küçük boylu ve 3 çift bacaklıdır.
- Un akarı yüksek nemli ve sıcak koşulları sever.
- Bu koşullarda gelişme süresi 2 hafta kadardır.

Zararlı Olduğu Ürünler:

- Hububat, un ve undan üretilen maddeler.

Zarar Şekli

- Ambar böcekleri, bulaştıkları ürünlerde yoğun bir biçimde beslenerek ağırlık, kayıpları oluştururlar.
- Zararlıların gömlek kalıntıları, pislikleri ve salgıladıkları ağ maddeleri nedeniyle, ürün nitelik kayıplarına uğrar.
- Yoğun bulaşmalarda üründe küflenme, kızışma ve kokuşmalar ortaya çıkar.
- Birinci derecedeki zararlılar doğrudan sağlam tanede zarar yapabilmektedir. Bunlar; Buğday biti, Pirinç biti, Kapra böceği, Arpa güvesi ve Ekin kambur biti.
- Sağlam tanede zararlı olmayanlar ise ikinci grupta yer alırlar. Bunlar; Kıрма bitleri, Un kurdu, Testere böcek, Küçük kıрма biti, Ekin kara böceği .

Mücadelesi

Kültürel Önlemler

- Zararlı girişini engellemek üzere pencerelere uygun sıklıkta tel geçirilir.
- Ambar yüzeylerindeki yarıklar, çatlak vb. sıva ile kapatılır.
- Ürünün nemi %13'den fazla olmamalıdır
- Yığın ve istifler ile duvar arasında 0.5 m aralık bırakılır.
-

Kimyasal Mücadele

- Kullanılacak ilaçlar ve dozları hakkında en yakın il veya ilçe müdürlüklerine başvurulmalıdır.