

## UN GÜVESİ (*Pyralis farinalis*)



Un güvesi Ergini



Un güvesi Larva ve Zararı

### Tanımı ve Yaşayışı

- Ergin kırmızımsı esmer renkli boyu 10-12 mm olan bir güvedir.
- Ön kanatların ucunda ve sonunda kıızımsı kahverengi zikzak bantlar vardır.
- Ön ve arka kanatlar saçaklıdır.
- Larva grimsi beyaz renkli, 18-20 mm uzunluğundadır.
- Larvaların vücudu kıllarla kaplıdır..
- Ergin dişi bir haftalık yaşam süresi içinde gıda ortamına 200-400 kadar yumurta bırakır.
- Elverişli koşullarda gelişme süresi 6-8 haftadır.

### Zararlı Olduğu Ürünler:

- Hububat, un ve undan üretilen maddeler.

### Zarar Şekli

- Ambar böcekleri, bulaştıkları ürünlerde yoğun bir biçimde beslenerek ağırlık, kayıpları oluştururlar.
- Zararlıların gömlek kalıntıları, pislikleri ve salgıladıkları ağ maddeleri nedeniyle, ürün nitelik kayıplarına uğrar.
- Yoğun bulaşmalarda üründe küflenme, kızışma ve kokuşmalar ortaya çıkar.
- Birinci derecedeki zararlılar doğrudan sağlam tanede zarar yapabilmektedir. Bunlar; Buğday biti, Pirinç biti, Kapra böceği, Arpa güvesi ve Ekin kambur biti.
- Sağlam tanede zararlı olmayanlar ise ikinci grupta yer alırlar. Bunlar; Kıрма bitleri, Un kurdu, Testereli böcek, Küçük kıрма biti, Ekin kara böceği .

### Mücadelesi

#### Kültürel Önlemler

- Zararlı girişini engellemek üzere pencerelere uygun sıklıkta tel geçirilir.
- Ambar yüzeylerindeki yarık, çatlak vb. sıva ile kapatılır.
- Ürünün nemi %13'den fazla olmamalıdır
- Yığın ve istifler ile duvar arasında 0.5 m aralık bırakılır.
- 

#### Kimyasal Mücadele

- Kullanılacak ilaçlar ve dozları hakkında en yakın il veya ilçe müdürlüklerine başvurulmalıdır.