

YENİDÜNYA KARALEKESİ HASTALIĞI

(*Venturia inaequalis*)



Yapraklardaki belirtisi

Hastalık Belirtisi

- Hastalık yapraklarda düzenli olmayan farklı büyüklükte, önceleri sarı daha sonra kırmızımsı kahverengi lekeler görülür.
- Sürgünler normal gelişemezler, yaprak dökümü erken olur ve zamanla ağaç yapraksız kalır.
- Meyveler yuvarlak veya şekilsiz, önceleri açık yeşil zamanla siyahlaşan lekeler oluşur.
- Şiddetli ve erken hastalıklarda meyveler çatlar, zamanla kararır ve ağaçta asılı kalır.

Hastalığın görüldüğü bitkiler

- Yenidünya

Mücadele yöntemleri

Kültürel önlemler

- Ağaç üzerindeki hastalıklı sürgünler, meyveler ve yapraklar toplanıp bahçeden uzaklaştırılmalıdır.

- Çiçeklenme dönemi 1–1,5 ay sürmesi nedeniyle ilaçlama zamanları çok önemlidir. Bahçede homojen bir çiçeklenme için bahçelerin aşılı ve aynı çeşit fidanlarla tesis edilmelidir.
- Güneşten azami yararlanma, iyi havalanma, yaprak ve meyvelerin ıslak kalma sürelerinin azaltılması amacıyla ağaçlar arasının 8 m'den az olmaması gereklidir.

Kimyasal önlemler

Kullanılacak ilaçlar ve dozları hakkında en yakın il veya ilçe müdürlüklerine başvurulmalıdır.